



Le Huîtrier pie

(*Haematopus ostralegus*)

Ordre : Charadriiformes
Famille : Haematopodidae

Le mâle et la femelle sont identiques : leur plumage est d'un noir intense sur le dos et les ailes, blanc sur le ventre. En automne et en hiver le menton blanchit et un croissant blanc apparaît sur la gorge. Les jeunes ont le dos brun tirant sur le roux et le bec marron.

Le huîtrier pie consomme principalement des petits coquillages (moules, coques, bigorneaux) dont il brise la coquille grâce à son bec puissant. Il ne dédaigne pas les vers marins ou les cadavres de poissons, voire d'oiseaux.

L'été, il ajoute à son menu des insectes. Il installe son nid à découvert sur les arrières-plages,

qu'elles soient de sable ou de galets, sur les rochers ou sur les prés à proximité de l'estran. Le nid est une simple cuvette creusée par les parents qui le garnissent de coquilles et d'arêtes. Une fois par an, la femelle pond de 2 à 4 oeufs qui peuvent être blanc crème avec des taches brun-noir ou brun-rouge. La pondaison a lieu entre la mi-mars et la mi-juillet, la couvaison dure de 25 à 27 jours. Les petits prendront leur envol entre le 34ème et le 36ème jour.

Taille : 40 - 45 cm
(bec : 8 - 9 cm)

Poids : 400 - 745 g